

Guia de relatório histopatológico de carcinoma do ovário, da trompa de Falópio e peritoneal primário



Apelido Data de nascimento

Nome(s) próprio(s)

Elementos de identificação do doente Data do pedido Número de acesso/laboratório

Os elementos a **negrito** são OBRIGATÓRIOS. Os elementos a **cinzento** são RECOMENDADOS.

ESTADO GENÉTICO (Nota 1)

- BRCA1 Não conhecido
 BRCA2
 Síndrome de Lynch
 Outro

QUIMIOTERAPIA ANTERIOR (Nota 2)

- Nenhuma quimioterapia administrada Não conhecido
 Quimioterapia anterior administrada

TIPO DE AMOSTRA (selecionar todos os itens que se apliquem) (Nota 3)

- Ovário direito Não especificado
 Ovário esquerdo
 Cistectomia ovárica direita
 Cistectomia ovárica esquerda
 Trompa de Falópio direita
 Trompa de Falópio esquerda
 Útero
 Colo do útero
 Epíploo
 Biopsias peritoneais
 Lavagens peritoneais/Líquido ascítico
 Gânglios linfáticos [especificar local(is)]

- Outro, p. ex., intestino, bexiga, apêndice (especificar)

INTEGRIDADE DA AMOSTRA (Nota 4)

Necessária apenas se forem submetidos ovário(s)/trompa(s) de Falópio

Ovário direito

- Cápsula ovárica intacta
 Cápsula ovárica roturada
 Tumor na superfície
 Amostra fragmentada
 Outra

Ovário esquerdo

- Cápsula ovárica intacta
 Cápsula ovárica roturada
 Tumor na superfície
 Amostra fragmentada
 Outra

Trompa de Falópio direita

- Serosa intacta
 Serosa roturada
 Tumor na superfície serosa
 Amostra fragmentada
 Outra

Trompa de Falópio esquerda

- Serosa intacta
 Serosa roturada
 Tumor na superfície serosa
 Amostra fragmentada
 Outra

LOCAL MACROSCÓPICO DO TUMOR

(selecionar todos os itens que se apliquem) (Nota 5)

- Ovário esquerdo Indeterminado
 Ovário direito
 Trompa de Falópio esquerda
 Fimbrial
 Não fimbrial
 Trompa de Falópio direita
 Fimbrial
 Não fimbrial
 Peritoneu
 Outra (especificar)

DIMENSÕES DO TUMOR (Nota 6)

 x x

(Nota: em caso de tumores separados, especificar as dimensões de cada local)

DESCRIÇÃO MACROSCÓPICA DO EPÍPLOO (Nota 7)

Necessária apenas se for submetido epíploo

Dimensões do epíploo

 x x

Envolvimento do epíploo

Com envolvimento Sem envolvimento

Dimensão máxima do depósito maior

LEGENDA DE IDENTIFICAÇÃO DOS BLOCOS (Nota 8)

(enumerar no verso ou numa folha separada, com indicação da natureza e da origem de todos os blocos de tecido)

TIPO HISTOLÓGICO DO TUMOR (Notas 9 e 10)

PADRÃO DE INVASÃO

(apenas para carcinomas mucinosos Nota 11)

- Expansível Infiltrativo/destrutivo

SUBTIPOS DE CARCINOSSARCOMA (Nota 12) Epitelial

Percentagem %

Enumerar subtipos

 Sarcomatoso

Percentagem %

Tipo: Heterólogo Homólogo

Enumerar subtipos

GRAU DO TUMOR (Nota 13)

Nota: caso tenha sido administrada quimioterapia, a classificação pode ter de se basear na biopsia pré-quimioterapia.

Carcinomas serosos:

- Baixo grau Não é possível classificar
 Alto grau

Carcinomas endometrioides:

- G1: bem diferenciado G3: mal diferenciado
 G2: moderadamente diferenciado GX: não é possível classificar

Carcinomas de células claras:

- Alto grau

Carcinomas indiferenciados:

- Alto grau

Carcinossarcomas:

- Alto grau

Carcinomas mucinosos:

- G1: bem diferenciado G3: mal diferenciado
 G2: moderadamente diferenciado GX: não é possível classificar

Nódulos de carcinoma anaplásico

(apenas para tumores mucinosos)

- Não identificado Presente

TUMOR "BORDERLINE" (Nota 14)

- Presente Ausente

Tipo histológico do tumor (Nota 10)

TUMOR "BORDERLINE" (cont.)**Características especiais****Arquitetura micropapilar para tumor "borderline" seroso (pelo menos 5 mm numa dimensão)**

- Ausente Presente

Microinvasão (limite superior de 5 mm)

- Ausente Presente

Carcinoma intraepitelial para tumor "borderline" mucinoso

- Ausente Presente

Implantes para tumor "borderline" seroso e seromucinoso Implantes não invasivos

- Não identificados Presentes

- Epitelial Desmoplásico

Local(is):

- Pélvico Abdominal

 Implantes invasivos/carcinoma seroso de baixo grau extraovárico

- Não identificados Presentes

Local(is):

- Pélvico Abdominal

 Indeterminado(s)

- Não identificados Presentes

Local(is):

- Pélvico Abdominal

CARCINOMA INTRAEPITELIAL TUBÁRIO SEROSO (STIC)

Necessário apenas se forem submetidas uma ou mais trompas de Falópio e aplicável apenas a carcinoma seroso de alto grau (Nota 15)

TF direita

- Presente — fimbrial
 Presente — não fimbrial
 Não identificado
 Não é possível avaliar

TF esquerdo

- Presente — fimbrial
 Presente — não fimbrial
 Não identificado
 Não é possível avaliar

LOCAIS HISTOLÓGICOS DO ENVOLVIMENTO TUMORAL (Nota 5)**Ovário direito**

- Sem envolvimento Não é possível avaliar
 Com envolvimento Não aplicável

Ovário esquerdo

- Sem envolvimento Não é possível avaliar
 Com envolvimento Não aplicável

Cápsula/superfície do ovário direito

- Sem envolvimento Não é possível avaliar
 Com envolvimento Não aplicável

Cápsula/superfície do ovário esquerdo

- Sem envolvimento Não é possível avaliar
 Com envolvimento Não aplicável

Trompa de Falópio direita

- Sem envolvimento Não é possível avaliar
 Com envolvimento Não aplicável

LOCAIS HISTOLÓGICOS DO ENVOLVIMENTO TUMORAL
(cont.)

Trompa de Falópio esquerda

- Com envolvimento Não é possível avaliar
 Sem envolvimento Não aplicável

Útero

- Sem envolvimento Não é possível avaliar
 Com envolvimento Não aplicável

Local(is): Miométrio Endométrio Colo do útero

Epíplo

- Sem envolvimento Não é possível avaliar
 Com envolvimento Não aplicável

Nível de envolvimento: Macroscópico Microscópico

Peritoneu (incluindo serosa uterina)

- Sem envolvimento Não é possível avaliar
 Com envolvimento Não aplicável

Locais: Pélvis [especificar local(is)]

Abdómen [especificar local(is)]

Outro(s) órgão(s)/local(is) envolvido(s) (especificar)

CITOLOGIA PERITONEAL (Nota 16)

- Negativa Indeterminada
 Positiva Não recebida

RESPOSTA À TERAPÊUTICA NEOADJUVANTE (Nota 17)

- Sem tratamento anterior
 Não é possível avaliar

ESTADO DOS GÂNGLIOS LINFÁTICOS (Nota 18)

- Não submetidos
 Sem envolvimento
 Com envolvimento

Regionais

Pélvicos esquerdos

Número de gânglios linfáticos examinados**

Número de gânglios linfáticos positivos**

****Nota:** em alguns casos, pode não ser possível registrar o número de gânglios linfáticos reais devido a fragmentação da amostra.

ESTADO DOS GÂNGLIOS LINFÁTICOS (cont.)

Regionais

Pélvicos direitos

Número de gânglios linfáticos examinados**

Número de gânglios linfáticos positivos**

Para-aórticos

Número de gânglios linfáticos examinados**

Número de gânglios linfáticos positivos**

Dimensão máxima do maior depósito em gânglio linfático regional mm

Não regionais

Local 1:

Número de gânglios linfáticos examinados**

Número de gânglios linfáticos positivos**

Local 2:

Número de gânglios linfáticos examinados**

Número de gânglios linfáticos positivos**

PATOLOGIA COEXISTENTE (Nota 19)

Endometriose (especificar locais)

Outra (especificar)

EXAMES COMPLEMENTARES

Marcadores imuno-histoquímicos (Nota 20)

Dados moleculares (Nota 21)

ESTADIAMENTO PATOLÓGICO PROVISÓRIO PRÉ-MDTM

FIGO (edição de 2014) (Permissão de direitos de autor pendente.)
(Nota 22)

Local do tumor primário

- Tumor primário, ovário (OV)
- Tumor primário, trompa de Falópio (TF)
- Tumor primário, peritoneu (P)
- Não designado: não é possível avaliar o local do tumor primário (X)

Estádio

- I Tumor confinado aos ovários ou à(s) trompa(s) de Falópio**
- IA** Tumor limitado a 1 ovário (cápsula intacta) ou trompa de Falópio; ausência de tumor na superfície do ovário ou da trompa de Falópio; ausência de células malignas no líquido de ascite ou em lavagens peritoneais
- IB** Tumor limitado a ambos os ovários (cápsulas intactas) ou trompas de Falópio; ausência de tumor na superfície do ovário ou da trompa de Falópio; ausência de células malignas no líquido de ascite ou em lavagens peritoneais
- IC** Tumor limitado a 1 ou a ambos os ovários ou trompas de Falópio, com qualquer uma das seguintes situações:
 - IC1 Derrame cirúrgico
 - IC2 Cápsula roturada antes da cirurgia ou tumor na superfície de um ovário ou trompa de Falópio
 - IC3 Células malignas no líquido de ascite ou lavagens peritoneais
- II Tumor envolve 1 ou ambos os ovários ou trompas de Falópio com extensão pélvica (abaixo do bordo pélvico) ou cancro peritoneal primário**
- IIA** Extensão e/ou implantes no útero e/ou nas trompas de Falópio e/ou ovários
- IIB** Extensão a outros tecidos intraperitoneais pélvicos
- III Tumor envolve 1 ou ambos os ovários ou trompas de Falópio, ou cancro peritoneal primário, com disseminação para o peritoneu fora da pélvis, com confirmação citológica ou histológica, e/ou metástases para os gânglios linfáticos retroperitoneais**
- IIIA1** Apenas gânglios linfáticos retroperitoneais positivos (comprovados citologicamente ou histologicamente):
 - IIIA1(i) Metástases de até 10 mm na sua dimensão máxima
 - IIIA1(ii) Metástases de mais de 10 mm na sua dimensão máxima
- IIIA2** Envolvimento peritoneal extrapélvico (acima do bordo pélvico) microscópico, com ou sem gânglios linfáticos retroperitoneais positivos
- IIIB** Metástases peritoneais macroscópicas para além da pélvis até 2 cm na dimensão máxima, com ou sem metástases nos gânglios linfáticos retroperitoneais
- IIIC** Metástases peritoneais macroscópicas além da pélvis com mais de 2 cm na dimensão máxima, com ou sem metástases nos gânglios linfáticos retroperitoneais (inclui extensão do tumor para a cápsula do fígado e baço sem envolvimento parenquimatoso de qualquer órgão)
- IV Metástases distantes excluindo metástases peritoneais**
- IVA** Derrame pleural com citologia positiva
- IVB** Metástases parenquimatosas e metástases para órgãos extra-abdominais (incluindo gânglios linfáticos inguinais e gânglios linfáticos fora da cavidade abdominal)