

Guide pour les rapports d'histopathologie des tumeurs du testicule – lymphadénectomie rétropéritonéale



Nom de famille

Prénom(s) Date de naissance

Identifiants du patient Date de la demande Numéro d'accès/de laboratoire

Les éléments **en texte noir** sont OBLIGATOIRES. Les éléments **en texte gris** sont RECOMMANDÉS.

INFORMATIONS CLINIQUES (Remarque 1)

Non fournies

Antécédents de cancer du testicule, *spécifier*

Thérapie antérieure, *spécifier*

Autre, *spécifier*

MARQUEURS TUMORAUX SÉRIQUES AVANT L'INTERVENTION

(sélectionner tout ce qui s'applique) (Remarque 2)

Non fournis

Fournis

Marqueurs tumoraux sériques dans les limites de la normale
OU

Spécifier les marqueurs tumoraux sériques utilisés, leur
taux et la date du prélèvement

Date AFP

LDH b-HcG

SPÉCIMEN(S) SOUMIS (sélectionner tout ce qui s'applique)

(Remarque 3)

Non spécifié

Lymphadénectomie rétropéritonéale, *préciser le
site ganglionnaire*

Aucune pathologie
 Nécrose
 Tumeur viable

Cerveau

Foie

Poumon

Autre, *spécifier*

TAILLE DE LA PLUS GRANDE MÉTASTASE GANGLIONNAIRE

(sélectionner tout ce qui s'applique)

(Remarque 4)

Ne peut être évaluée

Dimension maximale

Autres dimensions

 X

CLÉ D'IDENTIFICATION DES BLOCS (Remarque 5)

(Décrire au verso ou séparément avec une indication de la
nature et de l'origine de tous les blocs de tissus)

TYPE HISTOLOGIQUE DE LA TUMEUR (Remarque 6)

(Liste des valeurs de la Classification des tumeurs de l'Organisation
mondiale de la Santé, Pathologie et génétique du système urinaire et
des organes génitaux de l'homme [2016])

Tumeur viable

Présente

Absente

Tumeur des cellules germinales, *spécifier le type
et le pourcentage*

 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

Autre, *spécifier*

ÉTAT DES MARGES (Remarque 7)

Ne peut être évalué

Non atteintes

Marge la plus proche

Distance de la tumeur à la marge la
plus proche

Atteintes, *spécifier*

EXTENSION EXTRAGANGLIONNAIRE (Remarque 8)

- Non identifiée Présente Indéterminée

STADE PATHOLOGIQUE (TNM, 8^e édition)^{##}^(Remarque 9)**Ganglions lymphatiques régionaux (pN)**

- NX Les ganglions régionaux ne peuvent être évalués
- N0 Aucune métastase ganglionnaire régionale
- N1 Métastase(s) avec une masse ganglionnaire allant jusqu'à 2 cm dans sa plus grande dimension et cinq ganglions positifs ou moins, chacun mesurant 2 cm dans sa plus grande dimension
- N2 Métastase(s) avec une masse ganglionnaire mesurant plus de 2 cm mais pas plus de 5 cm dans sa plus grande dimension ; ou plus de cinq ganglions positifs, chacun mesurant 5 cm dans sa plus grande dimension ; ou signe d'extension extraganglionnaire de la tumeur
- N3 Métastase(s) avec une masse ganglionnaire mesurant plus de 5 cm dans sa plus grande dimension

Métastase à distance (pM) (si réséqué)

- Aucune métastase à distance
- M1 Métastase(s) à distance
- M1a Métastases ganglionnaires non rétropéritonéales ou pulmonaires
- M1b Métastases viscérales non pulmonaires

^{##} Utilisé avec la permission de l'American College of Surgeons, Chicago, Illinois. La source originale de ces informations est l'*AJCC Cancer Staging Manual*, huitième édition (2016), publié par Springer Science+Business Media.

[^] À noter, la mise en œuvre de la 8^e édition du manuel TNM de l'AJCC a été reportée jusqu'à janvier 2018 dans certaines juridictions. Dans l'intervalle, la 7^e édition de l'UICC ou la 7^e édition de l'AJCC peut être utile.