

Neoplasia do testículo – linfadenectomia retroperitoneal

Guia de relatório histopatológico



Apelido

Nome(s) próprio(s) Data de nascimento

Elementos de identificação do doente Data do pedido Número de acesso/laboratório

Os elementos a **negrito** são OBRIGATÓRIOS. Os elementos a **cinzento** são RECOMENDADOS.

INFORMAÇÕES CLÍNICAS (Nota 1)

Não fornecidas

Antecedentes de cancro testicular, *especificar*

Terapêutica anterior, *especificar*

Outra, *especificar*

MARCADORES TUMORAIS SÉRICOS PRÉ-INTERVENÇÃO

(selecionar todos os itens que se apliquem) (Nota 2)

Não fornecidos

Fornecidos

Marcadores tumorais séricos dentro dos limites normais
OU

*Especificar os marcadores tumorais séricos utilizados,
o nível e a data de análise dos marcadores*

Data AFP µg/l

LDH UI/l b-HcG UI/l

AMOSTRA(S) SUBMETIDA(S)

(selecionar todos os itens que se apliquem) (Nota 3)

Não especificado

Linfadenectomia retroperitoneal, *especificar o local ganglionar*

Sem doença

Necrose

Tumor viável

Cérebro

Fígado

Pulmões

Outra, *especificar*

TAMANHO DAS METÁSTASES GANGLIONARES DE MAIOR DIMENSÃO (selecionar todos os itens que se apliquem) (Nota 4)

Não é possível avaliar

Dimensão máxima

 mm

Dimensões adicionais

 mm X mm

LEGENDA DE IDENTIFICAÇÃO DE BLOCOS (Nota 5)

(enumerar no verso ou numa folha separada, com indicação da natureza e da origem de todos os blocos de tecido)

TIPO HISTOLÓGICO DO TUMOR (Nota 6)

(Lista de valores da Organização Mundial de Saúde, Classification of tumours. Pathology and genetics of urinary system and male genital organs [2016])

Tumor viável

Presente

Ausente

 %

Tumor de células germinativas, *especificar o tipo e a percentagem*

 ⇒ % ⇒ % ⇒ % ⇒ %

Outra, *especificar*

ESTADO DA MARGEM (Nota 7)

Não é possível avaliar

Sem envolvimento



Margem mais próxima

Distância do tumor desde a margem mais próxima

mm

Com envolvimento, *especificar*

EXTENSÃO EXTRAGANGLIONAR (Nota 8)

- Não identificada Presente Indeterminada

ESTADIAMENTO PATOLÓGICO (TNM 8.ª edição)^{##}^(Nota 9)**Gânglios linfáticos regionais (pN)**

- NX Não é possível avaliar gânglios linfáticos regionais
- N0 Sem metástases nos gânglios linfáticos regionais
- N1 Metástases com uma massa em gânglio linfático de 2 cm ou menor na sua dimensão máxima e com cinco ou menos gânglios linfáticos positivos, nenhuma das quais maior do que 2 cm na sua dimensão maior
- N2 Metástases com uma massa em gânglio linfático maior do que 2 cm, mas não superior a 5 cm na dimensão máxima; ou mais do que cinco gânglios linfáticos positivos, nenhuma das quais com tamanho superior a 5 cm ou evidências de extensão extraganglionar do tumor
- N3 Metástases com massa em gânglio linfático maior que 5 cm na dimensão maior

Metástases distantes (pM) (se ressecadas)

- Sem metástases distantes
- M1 Metástases distantes
- M1a Metástases ganglionares não retroperitoneais ou metástases pulmonares
- M1b Metástases viscerais não pulmonares

^{##} Utilizado com permissão do American College of Surgeons (Colégio Americano de Cirurgiões), Chicago, Illinois, EUA. A fonte original destas informações é o AJCC Cancer Staging Manual, Eighth Edition (2016) (Manual de Estadiamento do Cancro da AJCC, oitava edição [2016]), publicado por Springer Science+Business Media.

[^] Ter em atenção que, em algumas zonas, a implementação da TNM da AJCC, 8.ª edição, foi adiada até janeiro de 2018. Neste período, a UICC 7.ª edição ou a AJCC 7.ª edição podem ser úteis.